




Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

Preveniți intrarea Pestei porcine africane



Pesta porcină africană (PPA) este o boală infecțioasă de origine virală care apare la porci și mistreți. Boala avansează spre Europa de Vest prin țările est-europene.

Începând cu 2014 boala a apărut în diferite țări europene, cum ar fi Polonia, Ungaria, Estonia, Letonia, Lituania și România. Virusul poate fi găsit în produsele locale din carne de porc. Deși nu cauzează îmbolnăvirea omului, virusul se poate răspândi prin resturile alimentare contaminate găsite de mistreți.

Ce puteți face?

Nu luați produse din carne din zonele infectate. Acest lucru se aplică oricărei

persoane care călătorește în Europa de Est pentru orice motiv, inclusiv turiști, șoferi de camioane, oameni de afaceri și vânzători.

PPA se poate transmite prin mâncare. Nu dați niciodată de mâncare porcilor și nu aruncați în mod imprudent resturile alimentare în mediul înconjurător sau lângă o fermă sau o grădiniță zoologică, Aruncați resturile alimentare doar în coșuri de gunoi care se închid.

Crescătorii de porci trebuie să se asigure că vizitatorii nu aduc produse alimentare cu ei. Evitați contactul cu porcii. Dacă acest lucru nu poate fi evitat, luați măsuri de igienă, cum ar fi dușul și curățarea îmbrăcămintei și


a încălțăminteii. Curățați și dezinfectați vagoanele pentru transportul animalelor din zonele infectate.

Vânători

Nu folosiți câini la vânătoare. Rețineți că oasele de porci cu PPA pot răspândi boala. Curățați și dezinfectați toate echipamentele și mijloacele de transport care au fost utilizate la vânătoare. Folosiți mănuși și spălați bine mâinile. Nu atingeți un mistreț potențial infectat; raportați descoperirea dvs. autorităților locale.

Simptome și infecție

Animalele infectate pot avea febră și pot fi slăbite. Ele își pierd apetitul și pot prezenta membrane mucoase sângerânde, piele roșie, diaree (cu sânge) și vărsături. Pentru a putea pune un diagnostic sunt necesare teste de laborator. Infecția poate apărea prin contact direct între porci, dar și prin echipamente și hrană contaminate. Virusul este rezistent și poate supraviețui în oase perioade lungi de timp.



Contact

În cazul în care suspectați prezența peștei porcine africane în Olanda, contactați imediat Autoritatea olandeză pentru siguranța produselor alimentare și a consumatorului (NVWA): **045 – 5463188**