




Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

Zapobiegaj sprowadzeniu afrykańskiego pomoru świń



Afrykański pomór świń (ASF) to zakaźna choroba wirusowa występująca wśród świń i dzików. Choroba ta coraz powszechniej występuje w krajach Europy Wschodniej i zaczyna się rozprzestrzeniać w kierunku Europy Zachodniej.

ASF występuje od 2014 roku w różnych krajach Unii Europejskiej, takich jak Polska, Węgry, Estonia, Łotwa, Litwa i Rumunia. Wirus może być obecny w lokalnych produktach z mięsa wieprzowego. Nie powoduje zachorowań u ludzi, ale może się rozprzestrzeniać, jeżeli świnie i dziki znajdą zakażone reszki jedzenia.

Co możesz zrobić?

Nie zabieraj żadnych produktów mięsnych ze skażonych terenów. Zalecenie to dotyczy

wszystkich podróżujących do Europy Wschodniej, niezależnie od powodu podróży: turystów, kierowców ciężarówek, osób podróżujących w interesach i myśliwych.

Wirus ASF może być przenoszony w artykułach spożywczych. Nigdy nie dawaj więc żywności świniom i nie wyrzucaj jej nieuważnie w naturze ani w okolicy gospodarstw rolnych czy zwierzyńców dla dzieci. Wyrzucaj produkty spożywcze tylko w zamkniętych pojemnikach na odpady.

Hodowcy świń muszą zwracać uwagę, aby odwiedzający nie wnosili na teren gospodarstwa żadnej żywności. Unikaj kontaktu ze świniami. Jeżeli będzie on nieunikniony, przestrzegaj wszystkich


środków higieny, takich jak wzięcie prysznicza, założenie czystej odzieży i obuwia. Czyść i dezynfekuj pojazdy do przewozu zwierząt ze skażonych obszarów.

Myśliwi

Nie poluj z psami. Pomyśl o tym, że choroba może być także przenoszona przez kości zarażonych ASF świń. Czyść i dezynfekuj używany podczas polowania sprzęt i środki transportu. Używaj rękawic i starannie myj ręce. Nigdy nie dotykaj dzika, który może być zarażony chorobą - zgłoś znalezione zwierzę lokalnym władzom.

Objawy choroby i zakażenie

U zwierząt może występować gorączka i osłabienie. Do objawów należy utrata apetytu, krwawienie błon śluzowych, zaczerwienienie skóry, (krwiste) biegunki i wymioty. Do postawienia diagnozy konieczne jest wykonanie testów laboratoryjnych. Zakażenie może nastąpić po bezpośrednim kontakcie między świniowatymi, ale także poprzez skażony sprzęt lub paszę. Wirus jest odporny i może przez długi czas przetrwać w kościach.



Kontakt

W razie podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w Holandii skontaktuj się natychmiast z Holenderskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich [Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit]

> **NVWA: 045 - 5463188**